



CEDRIG  
Light

## Horti-Sempre Phase 2, Nacala Corridor dans le nord du Mozambique

—  
Michael Fink, Tobias Sommer, Fabian Mauchle  
Junio 2018



CEDRIG es una herramienta desarrollada y ofrecida por



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el Desarrollo  
y la Cooperación COSUDE

## ● Resumen

### Información general

**Contributors** Michael Fink, Swisscontact  
Tobias Sommer, SDC, Suiza  
Fabian Mauchle, SDC, Suiza

**Objetivo general** L'objectif général de Horti-Sempre est d'augmenter le revenu net annuel de 25'000 petits exploitants de 30 % en soutenant la croissance du secteur horticole dans le nord du Mozambique, ce secteur étant avéré générateur de revenus.

**País** Mozambique

**Presupuesto** 6'500'000 CHF

**Duración** 01/2017 - 12/2020 (48 mois)

### Resumen

**Descripción** L'objectif du projet Horti-Sempre Phase 2 est d'augmenter le revenu net annuel des petits exploitants de 30 % par rapport au revenu de référence en soutenant la croissance du secteur horticole dans le nord du Mozambique, secteur dont l'importance en tant que créateur de revenus a été démontrée. Pour remplir sa mission et atteindre cet objectif, Swisscontact propose pour Horti-sempre Phase 2 une logique d'intervention basée sur trois résultats principaux déployés autour de trois composantes principales à savoir (1) les intrants et les pratiques, (2) l'irrigation et (3) la compétitivité sectorielle. RÉSULTAT No 1: La productivité des petits exploitants horticoles du corridor de Nacala dans le nord du Mozambique a augmenté. RÉSULTAT No 2: Les petits exploitants horticoles du corridor de Nacala dans le nord du Mozambique ont augmenté leurs superficies irriguées. RÉSULTAT No 3: La réactivité du marché et la compétitivité du secteur horticole dans le nord du Mozambique ont augmenté. Sur la base de l'expérience de la phase 1, Swisscontact estime que la phase 2 de Horti-Sempre pourrait atteindre 10'000 petits exploitants semi-commerciaux et 15'000 petits exploitants de subsistance dans le nord du Mozambique, ce qui augmenterait leurs revenus de 30%.

**Términos clave** agriculture sécurité alimentaire  
développement rural gestion de l'eau

### Sectores de Intervención

Agricultura

Seguridad alimentaria

Desarrollo rural

Gestión del agua

## Documentos

MER\_Climate Change Profile (pdf, 1.2 MB)

Presentation\_Climate Data\_Moz (pdf, 1.01 MB)

FANRPAN\_Fact Sheet Moz (pdf, 219.89 KB)

Banque Mondiale - Profil du changement climatique Mozambique (pdf, 2.61 MB)

## Imágenes



Formation sur les solutions d'irrigation de base

Formation sur les solutions d'irrigation de base



Formation aux pratiques agricoles

Formation aux pratiques agricoles



Construction d'un barrage souterrain

Construction d'un barrage souterrain



Culture horticole protégée

Culture horticole protégée



Barrage souterrain rempli d'eau

Barrage souterrain rempli d'eau



Solution d'irrigation de base en service (pompe à hip)

Solution d'irrigation de base en service (pompe à hip)

## ○ Perspectiva del riesgo

### Amenazas que se producen debido a la degradación del medioambiente

Nombre de la amenaza **Degradación (tierra, suelo, ecosistemas, biodiversidad)**

Exposición Sí

Comentarios La dégradation des sols est souvent le résultat de mauvaises pratiques de conservation (pas de couverture des sols, travail du sol en profondeur, faible biodiversité) aggravées par les fortes pluies. Par conséquent, davantage d'intrants sont nécessaires, ce qui crée un cercle vicieux de dégradation.

Consecuencia **Les principales conséquences sont la baisse des rendements due à la dégradation des sols et le besoin accru des agriculteurs d'utiliser des intrants (engrais).**

Probabilidad  
Probable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo medio

Nombre de la amenaza **Contaminación del agua (superficiales y subterráneas)**

Exposición Sí

Comentarios Pollution de l'eau principalement dans les zones périurbaines due à la pollution des eaux urbaines et des sols (par ex. des usines, des déchets, etc.).

Consecuencia **Les conséquences principales sont la perte de qualité des produits, ainsi que les risques potentiels pour la santé des consommateurs. L'évaluation des dangers est difficile en raison de la disponibilité limitée de données sur la qualité de l'eau et du sol**

Probabilidad  
Probable

Alcance  
Ligeramente perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo bajo

Nombre de la amenaza **Plagas y epidemias**

Exposición Sí

**Comentarios** Les ravageurs et les épidémies sont dus à une mauvaise rotation des cultures et au manque de connaissances ou de disponibilité et de formulation de défenses (pesticides, insecticides, fongicides). Les ravageurs et les épidémies sont plus fréquents pendant la saison chaude et pluvieuse que pendant la saison froide et sèche.

**Consecuencia** **Les principales conséquences sont les pertes de récoltes (parfois défailantes) et le fait que les agriculteurs évitent la production durant les mois plus chauds et plus humides de l'année.**

Probabilidad  
Probable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo medio

## Amenazas naturales (hidrometeorológicas y geológicas)

Nombre de la amenaza  
**Olas de calor**

Exposición Sí

**Comentarios** Selon la Banque mondiale, le numéro de jours chauds par an a augmenté de +25 au cours des 40 dernières années. Une grande partie de cette augmentation s'est produite au cours de l'automne dans l'hémisphère Sud. Cela correspond au premier cycle de récolte de nombreuses cultures importantes dans le pays, ce qui a des répercussions majeures sur les dommages liés aux ravageurs et les rendements agricoles.

**Consecuencia** **Les principales conséquences en sont le raccourcissement de la saison de croissance, les mauvaises récoltes (aucun rendement) ou les pertes de récoltes (baisse des rendements).**

Probabilidad  
Muy probable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo alto

Nombre de la amenaza  
**Sequias**

Exposición No está claro

**Comentarios** Depuis les années 1960, les précipitations moyennes ont diminué en moyenne de -2,5 millimètres par mois (3,1 %) par décennie. Augmentation des précipitations sur les régions du nord, et conditions très variables dans les régions du centre. Périodes de sécheresse persistantes, conjuguées aux inondations épisodiques dans le sud du pays. Dans le nord du Mozambique, des sécheresses saisonnières se produisent, ce qui retarde les pluies.

## Consecuencia

**Les pluies retardées entraînent la perte de semences de cultures pluviales (par exemple le maïs) et la nécessité de reconstruire et de semer à nouveau les cultures.**

Probabilidad  
Probable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo medio

## Nombre de la amenaza

**Tormentas, tornados y/o huracanes, vientos fuertes, tormentas de arena**

Exposición Sí

**Comentarios** La fréquence des tempêtes a augmenté, mais les événements sont concentrés de façon saisonnière et les agriculteurs attendent normalement que le risque diminue avant de semer.

## Consecuencia

**Destruction de l'infrastructure de base et des cultures en début de croissance**

Probabilidad  
Improbable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo bajo

## Nombre de la amenaza

**Crecidas repentinas, inundaciones**

Exposición Sí

**Comentarios** Selon la Banque Mondiale, la proportion de jours de fortes précipitations a augmenté de 2,6 % par décennie. Le nombre de jours de fortes pluies s'élève actuellement à environ 25 jours par an. Cependant, les événements sont concentrés de façon saisonnière et les agriculteurs attendent normalement que ce risque soit plus faible avant de semer.

## Consecuencia

**Destruction de l'infrastructure de base et des cultures à un stade précoce de la croissance, destruction de l'infrastructure commerciale (p. ex. ponts et routes)**

Probabilidad  
Probable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo medio

## Nombre de la amenaza

**Pluies erratiques**

Exposición Sí

**Comentarios** Récemment, les pluies dans le nord du Mozambique sont en dehors des régimes des pluies habituels sur lesquels les agriculteurs comptent. Tendance à retarder les chutes de pluie.

## Consecuencia

**Difficile pour les agriculteurs de prévoir le début de la saison des pluies. Le cycle de croissance est reporté à la saison chaude quand il est difficile de produire de l'horticulture. Risque accru de ravageurs dû à l'humidité.**

Probabilidad  
Muy probable

Alcance  
Perjudicial

Importancia del riesgo  
Riesgo alto

## Amenazas que se producen debido al cambio climático (y la variabilidad del clima)

### Nombre de la amenaza

Tendencia general al aumento o disminución de la temperatura media

Exposición No

**Comentarios** Les températures ont généralement augmenté de +0,6° C au cours des quarante dernières années, avec des hausses particulièrement marquées pendant la saison chaude (septembre - mars). Jusqu' à présent, cette augmentation n' a pas eu de répercussions considérables sur l'horticulture, car les légumes sont produits pendant les mois d'hiver plus secs et plus frais (avril - août).

### Nombre de la amenaza

Cambios de frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos extremos y desastres relacionados (p.ej. olas de frío y calor, inundaciones, sequías, tormentas, huracanes, ciclones)

Exposición No

**Comentarios** La fréquence des inondations augmente dans le pays, mais surtout au Sud et au Centre où le Mozambique ne contrôle pas le système de barrage sur le fleuve principal (par exemple Limpopo, Save, etc.). D'autres événements (ouragans, cyclones, etc.) sont également concentrés dans le Sud/Centre.

### Nombre de la amenaza

Cambios en las estaciones

Exposición Sí

**Comentarios** Un changement de saison est observé dans le nord du Mozambique. La pluviométrie annuelle moyenne est restée similaire (voire légèrement supérieure). Cependant, les régimes de précipitations ont changé. On observe des précipitations plus irrégulières et localement concentrées, ce qui se traduit souvent par des inondations et une saison de croissance plus courte.

## Consecuencia

**Une saison de croissance plus courte, une période d'inactivité plus longue (période de famine - época de fome), l'imprévisibilité du temps de semis, la perte des premières semences (investissement), l'extension de la saison de croissance à des mois plus c**

Probabilidad

Muy probable

Alcance

Perjudicial

Importancia del riesgo

Riesgo alto

## ¿Evaluación detallada de riesgos necesaria?

Sí - Es necesaria una evaluación detallada de riesgos



## ● Perspectiva del impacto

### Calcule el impacto en el medioambiente

#### Área medioambiental Ecosistemas

Componente de la actividad Barrages souterrains

Impacto sobre el medioambiente Rétention d'eau de pluie à petite échelle augmentant l'humidité du sol pouvant potentiellement modifier l'écosystème; pollution supplémentaire limitée due au plastique utilisé pour construire le barrage.

#### Área medioambiental Suelo

Componente de la actividad Intrants (engrais et pesticides)

Impacto sobre el medioambiente L'utilisation d'engrais et de pesticides par les petits exploitants horticoles est courante. Toutefois, les montants utilisés sont très limités en raison d'un manque de ressources financières. On peut donc s'attendre à un léger impact négatif sur les sols. Le projet ne donne que des conseils techniques suivant une approche de marché et ne favorise pas directement l'utilisation accrue d'engrais et de pesticides pour la production horticole.

### Calcule el impacto en el cambio climático

Componente de la actividad Augmentation des volumes et désaisonnalisation de la production horticole

Impactos en el cambio climático Diminution possible des émissions de gaz à effet de serre en raison de la production horticole locale et d'itinéraires de transport plus courts. Les importations internationales et interrégionales pourraient diminuer en raison d'une plus grande disponibilité de légumes produits localement.

### ¿Evaluación detallada de los impactos necesaria?

No - No es necesaria una evaluación detallada de los impactos